



Campagnole

Dichiarazione Ambientale di Prodotto



Barilla ha sviluppato il primo sistema EPD certificato in ambito alimentare



Barilla
The Italian Food Company. Since 1877.

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

NUMERO DI REGISTRAZIONE

S-P-00423

CODICE CPC

234 BAKERY PRODUCTS
PCR 2012:06 VER. 3.0
20/01/2020

DATA DI PUBBLICAZIONE

06/05/2014

REVISIONE

3 del 2020/05/13

VALIDO FINO AL

2025/05/12

PROGRAMME

The International EPD® System
www.environdec.com

PROGRAMME OPERATOR

EPD International AB

Questa EPD è stata sviluppata in conformità con la ISO 14025. Una EPD dovrebbe fornire informazioni aggiornate e potrebbe essere revisionata, qualora le condizioni cambiassero. La validità dichiarata è quindi soggetta a registrazione e pubblicazione continuative su www.environdec.com.

1. Il marchio e il prodotto

IL MARCHIO MULINO BIANCO

Fondato nel 1975, offre una serie di prodotti da forno semplici e genuini per un consumo sia a casa che fuori.

Rappresenta parte della cultura italiana sul cibo e nella vita di tutti i giorni. Con questo brand si trovano molti prodotti dolci e salati tra cui biscotti, merendine, pani.

Il costante impegno di Mulino Bianco nei confronti della sostenibilità ha permesso di raggiungere importanti risultati in termini di risparmio di risorse e di riduzione degli impatti delle confezioni.

Maggiori dettagli si trovano sul sito del [Mulino Bianco](https://www.mulinobianco.it).

LO STABILIMENTO E IL PROCESSO


Le Campagnole vengono prodotte nello stabilimento italiano di Castiglione delle Stiviere (MN).

Il processo di produzione delle Campagnole prevede la preparazione dell'impasto, la formatura dei biscotti, la cottura in forno alimentato a gas metano, il raffreddamento ed il confezionamento.

Campagnole sono vendute in confezioni riciclabili da 350, 700 e 1 000 grammi e sono pronte per il consumo.

Maggiori informazioni sul sito del [Mulino Bianco](https://www.mulinobianco.it).

IL PRODOTTO



VALORI NUTRIZIONALI (PER 100 G)


Energia	kJ	1 942
	kcal	462
Grassi dei quali saturi	grammi	17 4,3
Carboidrati dei quali zuccheri	grammi	69,4 20
Fibra	grammi	3,0
Proteine	grammi	6,4
Sale	grammi	0,875

2. Il gruppo Barilla

Fondata a Parma nel 1877 da una bottega per la produzione di pasta e pane, Barilla oggi è leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi in Europa Continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi Nordici. Il Gruppo Barilla possiede **28 siti produttivi** (14 in Italia e 14 all'estero) ed esporta in più di 100 Paesi.

Ogni anno, i suoi stabilimenti producono circa 1 800 000 tonnellate di prodotti alimentari, consumati sulle tavole di tutto il mondo, con i marchi Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Gran Cereale, Pan di Stelle ed Academia Barilla.

Maggiori informazioni sul sito www.barillagroup.com



La Nostra Missione: Buono per Te, Buono per il Pianeta

Quando aprì la sua bottega nel 1877, l'obiettivo prevalente di Pietro Barilla era produrre cibo buono. Oggi, questo principio si è tramutato nella missione a livello corporate di Barilla: "Buono per Te, Buono per il Pianeta".

BUONO PER TE significa: migliorare continuamente il profilo nutrizionale dei prodotti esistenti e lanciare nuovi prodotti che siano gustosi, sicuri e contribuiscano ad una dieta equilibrata; promuovere stili di vita sani e un'alimentazione sostenibile, ispirata allo stile di vita italiano e alla Dieta Mediterranea.

BUONO PER IL PIANETA significa: migliorare l'efficienza dei processi produttivi, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e i consumi idrici; promuovere pratiche agricole e di allevamento più sostenibili per tutte le filiere strategiche del Gruppo.



3. Il calcolo delle performance ambientali



Le performance ambientali del prodotto sono state valutate mediante la **metodologia LCA (Life Cycle Assessment)** prendendo in considerazione l'intera filiera a partire dalla coltivazione delle materie prime fino al trasporto del prodotto finito alle principali piattaforme di distribuzione. Lo studio è stato effettuato seguendo le regole per categoria di prodotto rilasciate dall'**International EPD System**: "CPC code 234 – Bakery products". I dati generici contribuiscono al calcolo della performance ambientale per meno del 10%.

UNITÀ DICHIARATA

I risultati presentati sono riferiti a **1 kg** di prodotto più il relativo imballaggio. L'imballaggio è riferito alla confezione da **350 grammi**, riportata a 1 kg di prodotto.

CONFINI DEL SISTEMA

I processi che costituiscono il sistema analizzato sono stati organizzati in **tre fasi** in linea con i requisiti del sistema EPD.



4. Produzione degli ingredienti



FARINA DI GRANO TENERO E RISO

I dati relativi alla coltivazione del grano tenero per la farina di frumento sono valori medi stimati da esperti Barilla. Le rese di coltivazione sono calcolate come media degli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018). I dati relativi alla coltivazione del riso derivano da letteratura (Blengini, 2009).

ZUCCHERO

I dati di inventario relativi alla produzione di zucchero sono primari e provengono da uno dei fornitori di Barilla.

BURRO e OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

I dati relativi alla produzione di burro derivano da Nilsson et al. (2010). I dati relativi all'olio di girasole provengono da Agrifootprint per la fase di coltivazione e da Nilsson et al. (2010) per le fasi di estrazione e raffinazione.

PRODUZIONE DEGLI INGREDIENTI



UOVA

I dati di inventario relativi alla produzione di uova provengono da uno dei fornitori di Barilla.

ALTRE MATERIE PRIME

I dati relativi alle altre materie prime presenti nella ricetta derivano da banche dati internazionali.

LATTE

I dati relativi al latte intero e delle uova sono primari e provengono da uno dei fornitori di Barilla.

5. Produzione dell'imballaggio e dei materiali ausiliari




PACKAGING PRIMARIO

Le prestazioni ambientali associate alla fase di produzione dell'imballaggio sono state valutate considerando la confezione da 350 grammi (il formato più cautelativo)

L'imballaggio primario è composto da un film multistrato destinabile alla raccolta differenziata.

Dati primari (provenienti dall'unità che si occupa della progettazione degli imballaggi) sono usati sia per i quantitativi di imballaggio, sia per gli aspetti ambientali associati alla produzione degli stessi.

L'imballaggio utilizzato per le Campagnole è progettato al 100% per il riciclo.



PRODUZIONE DELL'IMBALLAGGIO



Dal 2004 Barilla progetta i nuovi imballaggi con uno strumento denominato LCA packaging design che consente di valutare gli impatti ambientali dei nuovi imballaggi, già in fase di progettazione.

PACKAGING PER IL TRASPORTO

Il packaging per il trasporto è costituito dagli espositori di cartone, utilizzati per la distribuzione del prodotto, e dal film plastico termoretraibile. Gli espositori sono realizzati prevalentemente in cartone riciclato. I dati utilizzati sono di tipo secondario e derivano da banche dati.

Le prestazioni ambientali associate ai materiali ausiliari sono state valutate considerando come dati primari i consumi dello stabilimento durante l'anno 2019. Dati secondari (Ecoinvent) sono stati usati per gli aspetti ambientali associati alla produzione dei materiali

6. Produzione delle Campagnole



INFORMAZIONI GENERALI

Le prestazioni ambientali associate al processo di produzione sono state valutate considerando come dati primari i consumi di energia e acqua e la produzione di rifiuti. Dati secondari (Ecoinvent) sono stati usati per gli aspetti ambientali associati alla produzione di energia e acqua.


ACQUA

Il consumo di acqua viene ricavato dai contatori presenti nelle Fornerie ed attribuiti alla produzione in esame secondo l'allocazione in massa (ossia in funzione dei kg di produzione). Il consumo di acqua dello stabilimento contiene al suo interno anche il quantitativo di acqua necessario per la realizzazione degli impasti. Cautelativamente, tale quantitativo viene conteggiato anche come ingrediente all'interno della ricetta del prodotto. Dato primario anno 2019.

RIFIUTI

I dati relativi sono ricavati dai registri di carico e scarico e sono stati suddivisi secondo l'allocazione in massa. Dato primario anno 2019.

PRODUZIONE DELLE CAMPAGNOLE



ENERGIA ELETTRICA

Il consumo di energia elettrica è stato suddiviso secondo il metodo dell'allocazione in massa (lo stabilimento produce altri prodotti oltre alle Campagnole). Barilla, attraverso il sistema di certificazione GO (Certificati di garanzia d'origine), acquista energia da fonte rinnovabile di tipo idroelettrico in quantità tale da coprire l'intera produzione Mulino Bianco. Dato primario anno 2019.

GAS METANO

Il consumo di metano è stato direttamente misurato mediante i contatori installati sulla linea di produzione. Dato primario anno 2019.

7. Distribuzione



DISTRIBUZIONE

Le Campagnole vengono prodotte nello stabilimento italiano di *Castiglione delle Stiviere*.

Gli impatti ambientali associati al trasporto e alla distribuzione sono stati valutati considerando le seguenti ipotesi:


- 99% del prodotto viene distribuito in Italia
- 1% del prodotto viene distribuito all'estero
- Il trasporto al negozio viene effettuato tramite:
 - 96% via terra (camion)
 - 4% via mare

Dati primari anno 2019.


Il trasporto non necessita di particolari condizioni di stoccaggio (ad esempio la refrigerazione).

Gli impatti relativi allo smaltimento del packaging per il trasporto sono stati calcolati considerando lo scenario medio italiano per il destino di plastica e carta/cartone.

Dati COMIECO Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2018, riportati nella pagina successiva e COREPLA, relazione sulla gestione 2018.



8. Smaltimento dell'imballaggio primario



Dati elaborati da COMIECO Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2018 e COREPLA relazione sulla gestione 2018

9. Risultati ambientali delle Campagnole

 USO DELLE RISORSE dati per 1 kg di prodotto		UPSTREAM		CORE	DOWNSTREAM		TOTALE
		 Produzione ingredienti	 Produzione imballaggio e materiali ausiliari	 Produzione	 Distribuzione	 Smaltimento imballaggio	
RISORSE DI ENERGIA PRIMARIE RINNOVABILI dati in MJ	Uso come vettore di energia	1,61E+00	2,52E+00	4,21E-01	2,92E-03	5,78E-05	4,55E+00
	Uso come risorsa*	0,00E+00	6,09E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,09E-01
	Totale	1,61E+00	3,13E+00	4,21E-01	2,92E-03	5,78E-05	5,16E+00
RISORSE DI ENERGIA PRIMARIE NON RINNOVABILI dati in MJ	Uso come vettore di energia	1,10E+01	3,99E+00	2,80E+00	1,08E+00	1,08E-03	1,89E+01
	Uso come risorsa	0,00E+00	1,68E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,68E-03
	Totale	1,10E+01	3,99E+00	2,80E+00	1,08E+00	1,08E-03	1,89E+01
Materie prime seconde (g)		0,00E+00	7,02E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,02E+01
Combustibili secondari rinnovabili (MJ, potere calorifico netto)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Combustibili secondari non rinnovabili (MJ, potere calorifico netto)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso di risorse idriche (litri)		6,39E+01	4,53E+01	9,61E-01	6,10E-02	4,19E-03	1,10E+02
 FLUSSI IN USCITA DAL SISTEMA dati per 1 kg di prodotto		UPSTREAM		CORE	DOWNSTREAM		TOTALE
		 Produzione ingredienti	 Produzione imballaggio e materiali ausiliari	 Produzione	 Distribuzione	 Smaltimento imballaggio	
Coprodotti destinati ad alimentazione animale (g)		0,00E+00	0,00E+00	1,18E+01	0,00E+00	0,00E+00	1,18E+01
Componenti per il riuso (g)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiali per il riciclo (g)		5,21E-01	3,95E-02	1,01E+01	6,48E+01	2,98E+01	1,05E+02
Materiali per il recupero energetico (g)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,44E-03	2,98E-03	9,43E-03
Energia esportata, elettrica (MJ)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia esportata, termica (MJ)		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Le risorse energetiche secondarie e i flussi di energia recuperata non mostrano contributi rilevabili.


*La biomassa convertita nel prodotto non è contabilizzata.

 INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE dati per 1 kg di prodotto		UPSTREAM		CORE	DOWNSTREAM		TOTALE
		 Produzione ingredienti	 Produzione imballaggio e materiali ausiliari	 Produzione	 Distribuzione	 Smaltimento imballaggio	
POTENZIALE RISCALDAMENTO GLOBALE - GWP (g CO ₂ eq)	Fossile	1,12E+03	2,02E+02	1,75E+02	7,55E+01	1,79E-01	1,57E+03
	Biogenico	5,53E+01	1,60E-01	8,80E-02	1,07E+01	4,92E+00	7,11E+01
	Uso suolo e cambiamento	3,45E+01	4,07E-01	1,41E-02	1,54E-03	6,74E-05	3,49E+01
	Totale	1,21E+03	2,03E+02	1,76E+02	8,62E+01	5,10E+00	1,68E+03
Acificazione - g SO ₂ equivalente		1,51E+01	9,21E-01	3,03E-01	4,01E-01	1,28E-03	1,68E+01
Eutrofizzazione - g PO ₄ ³⁻ equivalente		8,53E+00	1,86E-01	5,13E-02	7,13E-02	2,71E-03	8,84E+00
Form, di ossidanti fotochimici - g NMVOC equivalente		3,16E+00	8,62E-01	3,24E-01	5,09E-01	2,66E-03	4,86E+00
Potenziale di impoverimento abiotico - elementi g Sb eq		1,27E-03	8,56E-06	3,44E-07	1,75E-07	1,13E-08	1,27E-03
Potenziale di impoverimento abiotico, combustibili fossili - MJ, potere calorifico netto		1,03E+01	3,57E+00	2,73E+00	1,07E+00	9,86E-04	1,76E+01
Pontenziale scarsità di acqua, m3 eq		1,13E+01	2,69E+01	5,50E-02	2,43E-03	1,22E-04	3,82E+01
 RIFIUTI INVIATI A DISCARICA dati in grammi per 1 di prodotto		UPSTREAM		CORE	DOWNSTREAM		TOTALE
		 Produzione ingredienti	 Produzione imballaggio e materiali ausiliari	 Produzione	 Distribuzione	 Smaltimento imballaggio	
Rifiuti pericolosi*		7,68E-03	8,04E-01	4,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,2E-01
Rifiuti non pericolosi*		7,90E+01	2,00E+01	1,19E+01	9,52E+00	3,36E+03	3,5E+03
Rifiuti radioattivi		3,86E-01	3,93E-01	9,22E-02	3,92E-02	1,18E-04	9,1E-01

Il contributo biogenico del potenziale effetto serra si riferisce esclusivamente alle emissioni di metano biogenico.
Per quanto riguarda la CO₂ biogenica, il contributo risulta essere zero, perché la quantità assorbita è equivalente alla quantità di CO₂ emessa nel riferimento temporale di 100.

* Sono stati considerati solo i flussi derivanti da processi sotto il diretto controllo di Barilla, escludendo i flussigenerati nei processi dei dati secondari.

PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PRODOTTO



10. Differenze rispetto alle precedenti versioni dell'EPD

Le differenze rispetto alle precedenti versioni dell'EPD sono dovute principalmente all'aggiornamento delle rese di coltivazione dei cereali, ai fattori di emissione per i mix energetici specifici ed alla distribuzione di mercato.

Inoltre, nuovi fattori di caratterizzazione, nuovi indicatori e l'aggiornamento del GPI alla versione 3.1 sono stati applicati.

11. Informazioni aggiuntive

RIFERIMENTI

- International EPD Consortium, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 of 18/09/2019;
- WWF, Global Footprint Network, Zoological Society of London, Living Planet Report 2008, WWF (2008);
- Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya, Mesfin M. Mekonnen; Water Footprint The Water Footprint Manual 2011, Waterfootprint Network;
- PCR 2012:06 CPC 234: Bakery Products; ver. 3.0 del 20/01/2020;
- Nilsson K., Flysjö A., Davis J., Sim S., Unger N., Bell S. "Comparative life cycle assessment of margarine and butter consumed in the UK, Germany and France" 2010, Int J Life Cycle Ass vol. 15 num. 9 p 916-926;
- COMIECO Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2018;
- COREPLA relazione sulla gestione 2018;
- Eurostat database for waste management, latest version (2017)



Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto ma provenienti da programmi differenti potrebbero non essere confrontabili. Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

As EPD owner, Barilla has the sole ownership, liability and responsibility for the EPD.

EPD PROCESS CERTIFICATION

Product category Rules (PCR) review conducted by:
Technical Committee of the International EPD® system.
Chair Filippo Sessa
Contact via info@environdec.com

Program operator:
EPD International AB
Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden
info@environdec.com



EPD PROCESS CERTIFICATION

Independent verification of the declaration and data, according to ISO 14025:

- ☒ EPD process verification
- ☐ EPD verification - Third party verifier

PROCESS INTERNAL VERIFICATION

Procedure for follow-up of data during EPD validity involves third part verifier:

- ☐ Yes
- ☒ No

Third party verifier: Bureau Veritas Certification Sweden AB, Accredited by: SWEDAC



Process internal verifier: Ugo Pretato, Approved by: The International EPD® System



CONTACTS

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, via Mantova 166, 43122, Parma, Italy. www.barillagroup.com

For additional information relative to the activities of the Barilla Group or in regards to this environmental declaration, please contact:

Laura Marchelli - laura.marchelli@barilla.com



Technical support and grafic design: Life Cycle Engineering srl - Italy www.lcengineering.eu



12. Glossario

ECOLOGICAL FOOTPRINT

L'ecological footprint è la misura della superficie terrestre e acquatica necessaria a produrre le materie prime e ad assorbire le emissioni relative al ciclo di vita di un prodotto. Viene espressa in global metri quadri.

www.globalfootprint.org

CARBON FOOTPRINT

La carbon footprint di un prodotto è il totale delle emissioni di gas ad effetto serra prodotti lungo l'intero ciclo di vita. Si misura in massa di CO₂ equivalenti. In agricoltura un contributo rilevante è dato dalle emissioni di protossido di azoto (N₂O) dovute all'utilizzo dei fertilizzanti.

www.ipcc.ch

VIRTUAL WATER CONTENT

Il virtual water content è la quantità di acqua utilizzata direttamente o indirettamente nell'arco del ciclo di vita di un prodotto. È costituita dalla green water (l'acqua evapotraspirata dalle piante), dalla blue water (l'acqua utilizzata direttamente) e dalla grey water (l'acqua necessaria a diluire gli inquinanti per riportare i corpi idrici alle condizioni originarie).

www.waterfootprint.org

ACIDIFICAZIONE (AP)

Fenomeno per il quale le precipitazioni atmosferiche risultano avere pH inferiore alla norma. Può provocare danni alle foreste e alle colture vegetali, così come agli ecosistemi acquatici e ai manufatti. È dovuto alle emissioni di SO₂, di NO_x e di NH₃. Il potenziale di acidificazione viene espresso in grammi di SO₂ equivalenti.

EUTROFIZZAZIONE (EP)

Arricchimento dei corsi d'acqua in nutrienti che determina un eccessivo sviluppo di vegetazione negli ecosistemi acquatici e conseguente carenza di ossigeno. Il potenziale di eutrofizzazione è dovuto principalmente alle emissioni in acqua di fosfati e nitrati e si esprime in grammi di g PO₄³⁻ equivalenti.

FORMAZIONE DI OSSIDANTI FOTOCHIMICI (POFP)

Produzione di composti che per azione della luce sono in grado di promuovere una reazione di ossidazione che porta alla produzione di ozono nella troposfera. L'indicatore comprende soprattutto COV (composti organici volatili) e viene espresso in grammi di etilene equivalenti (g NMVOC - equivalenti).

Summary

THE BARILLA GROUP

Barilla
The Italian Food Company. Since 1877.

Born in Parma in 1877 as a bread and pasta shop, Barilla is today among the top Italian food groups, a world leader in the pasta and pasta sauce business in continental Europe, bakery products in Italy, and the crispbread business in Scandinavia. The group has 28 production plants (14 in Italy and 14 abroad) and employs a workforce of over 8 000 people.

THE MULINO BIANCO BRAND



Founded in 1975, Mulino Bianco offers a range of simple and wholesome baked goods for both home and outside consumption.

Mulino Bianco represents part of the Italian culture on food and everyday life.

With this brand, you will find many sweet and savory items including cookies, cakes, breads. The ongoing Mulino Bianco commitment to sustainability has achieved important results in terms of resources saving and reducing packaging impact.

THE PRODUCT



The product included in the analysis is Campagnole biscuit, produced in the Italian plant of Castiglione delle Stiviere (MN). Campagnole are sold in recyclable packaging of 350, 700 and 1 000 grams and they are ready for consumption.

DECLARED UNIT

Data are referred to 1 kg of product and related paper packaging of 350 g. The packaging format is designed for recycling.



ENVIRONMENTAL IMPACT

Global Warming Potential <i>fossil biogenic land use change</i>	g CO ₂ eq.	1.57E03 7.11E01 3.49E01
Acidification Potential	g SO ₂ eq.	1.68E01
Eutrophication Potential	g PO ₄ ³⁻ eq	8.84E00
Photochemical Oxidant Formation Potential	g NMVOC eq.	4.86E00

PRODUCT ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

